

rangées par Illiger, avec les Singes et les Makis, dans son ordre des *Pollicata*, ces dernières ayant un nerf dépresseur parfaitement distinct.

M. Thominot communique les notes suivantes :

*Note sur un nouveau genre de reptile de la famille des
Geckotiens,*
par M. Al. THOMINOT.

Parmi les reptiles recueillis au Cap de Bonne-Espérance par M. de Castelnau, consul de France, et adressés au Muséum d'histoire naturelle par ce savant voyageur, se trouvait un petit Geckotien que nous avons pu étudier grâce à l'extrême bienveillance de M. le Professeur L. Vaillant et de son aide-naturaliste M. Sauvage.

Ce Geckotien nous paraît devoir constituer un genre distinct, caractérisé par l'apparence feutrée des doigts, d'où le nom générique de *Dactychylikion* (1); nous avons dédié l'espèce à M. Braconnier, préparateur au Muséum, qui le premier a attiré notre attention sur le reptile qui fait l'objet de la note que nous avons l'honneur de présenter à la Société Philomathique.

Dactychylikion, gen. nov.

Doigts élargis à leur extrémité seulement, en forme de spatule, garnis en dessous de lamelles transversales non divisées par un sillon médian et garnies sur leur bord postérieur de franges très-fines qui leur donnent l'aspect général d'un feutrage.

Dactychylikion Braconnieri, n. sp.

Description. — Langue libre depuis son extrémité antérieure jusque vers le milieu. Mâchoire supérieure garnie d'environ cinquante dents, implantées sur le rebord de

(1) De δακτύλος, doigt, et de χιλικιον, feutré.

l'os; cinquante-cinq à soixante dents à la mandibule; ces dents sont relativement fortes, coniques et presque pointues. Sept plaques à la mâchoire supérieure; huit plaques à la mandibule; plaques mentonnières au nombre de trois, formant une surface pentagonale par leur ensemble; écailles gulaires allant en diminuant de grandeur à partir des plaques mentonnières; plaques de l'abdomen, ainsi que celles des cuisses et des jambes, grandes et de forme hexagonale; écailles du dos très-petites, sensiblement hexagonales.

Longueur de la tête contenue six fois et trois quarts dans la longueur totale du corps, sa plus grande largeur ayant à peu près la moitié de la distance comprise entre le bout du museau et la naissance de l'épaule. Membres longs et grêles; bras de même longueur que l'avant-bras; cuisse plus longue d'un quart que la jambe; doigts en forme de spatule, au nombre de cinq à chaque membre. Dessous des doigts garni de cinq lamelles non divisées par un sillon longitudinal et n'étant pas disposées en chevron, ainsi qu'on le remarque chez quelques genres de la famille; lames garnies à leur bord postérieur d'un grand nombre de petites franges leur donnant l'aspect d'un feutrage.

Malgré toute l'attention apportée à l'examen des doigts, nous n'avons pu savoir si les ongles existaient, ou non; nous avons toutefois constaté la présence d'une sorte de gaine qui semble destinée à les protéger.

Le dessus des doigts est recouvert de sept plaques, qui toutes ont une forme différente.

La queue, qui est très-grêle et plate vers son extrémité, est de même longueur que l'espace compris entre le bord du cloaque et l'extrémité du museau.

Il n'existe de pores ni au cloaque ni aux cuisses.

Dimensions. — Longueur totale 0^m,612; de la queue, 0,056; du tronc 0,037; de la tête 0,016; du cou 0,003; largeur entre les yeux 0,002.

Coloration. — Le dessus du corps est d'un vert-olivâtre et porte des marbrures noirâtres sur le dos; près de la naissance des cuisses se voient trois petites taches noires, disposées en travers; l'on aperçoit sur les membres

des bandes en chevron d'un brun roussâtre ; la queue est annelée de noir ; le ventre est d'un blanc jaunâtre.

Ce Geckotien a été trouvé aux environs du Lac N'Gami.

Sur un Eleotris d'espèce nouvelle,

Par M. Al. THOMINOT.

Parmi les poissons envoyés il y a déjà quelque temps au Muséum par M. Lantz se trouvait un *Eleotris* provenant de la Réunion qui, par le prolongement de certains rayons de la dorsale, fait partie du genre *Valenciennea* de Bleeker, et nous semble devoir être considéré comme d'espèce nouvelle, différent par la dentition de l'*Eleotris muralis*, C. V.

Eleotris Lantzii, n. sp.

D. I, 5 ; A. 12 ; P. 17 ; V. I, 4 ; C. 20.

Longueur de la tête contenue trois fois et un tiers dans la longueur du corps, caudale non comprise ; diamètre de l'œil compris deux fois dans l'espace interorbitaire ; longueur de la caudale contenue trois fois et demie dans la longueur du corps, la nageoire non comprise ; pectorales arrivant presque à l'anus ; hauteur du corps faisant la sixième partie de la longueur, sans la caudale ; troisième et quatrième rayons de la dorsale allongés. Pas d'épines à l'opercule. Écailles très-petites, à peine visibles. Dents longues, recourbées en arrière ; vers l'angle de la mâchoire une dent plus longue que les autres, suivie d'une rangée de dents bien plus petites ; pas de dents au vomer et aux palatins.

Longueur 0^m110.
